Nouveaux Curculionides de l'Amérique du Sud

par A. Hustache

Cyrtobagous n. gen. *Bagoini.*

Antennes subapicales glabres; scape claviforme au sommet, n'atteignant pas l'oeil; funicule de 7 articles, le 2.e long, presque du double aussi long que le 1.er et presque aussi long que les 3.e, 4.e, 5.e, ensemble, les suivants non épaissis, plus long qu'épais le 7.e contigu à la massue, la massue allongée, son 1.er article conique, glabre, double aussi long que le reste de la massue, cette dernière partie courte et feutrée de cendrée. Tarses linéaires, les articles de même largeur, revêtus d'une courte et dense pubescence grise et pruineuse, les trois première articles serrés, courts, d'égale longueur, le 4.e aussi long que les trois articles précédents ensemble, faiblement épaissi au sommet, ses ongles longs, parallèles, subconnés à la base. Rostre élancé, élargi dans son quart apical; scrobes antérieurs, latéraux, d'abord foveiformes et profonds, rapidement superficiels, obliques, ponctués et dirigés contre l'angle inférieur des yeux. Tête courte, les yeux réniformes, plats, largement séparés en dessus, leurs facettes grossières. Prothorax à bord antérieur droit, le bord postérieur légèrement échancré en arc; pas de lobes oculaires. Ecusson distinct, petit, arrondi, plan. Elytres courts, fortement convexes, l'épaules obliques et marquées, leur sommet rétréci en forme de bec court, fortement striés ponctué. Pattes assez longues les fémurs inermes; tibias linéaires, droits, tronqué au sommet, les antérieurs avec un court onglet apical. Prosternum à bord antérieur échancré en arc, les hanches contigues et insérées sur son bord postérieur. Hanches intermédiaires étroitement, les postérieures assez largement séparées. Deux premiers segments ventraux longs, subégaux, le 1.er largement impressionné au milieu, plus profondément chez le ♂, sa saillie intercoxale arrondie en avant, le 2.e segment obliquement déclive en arrière, les 3.e et 4.e segments très courts, le 5.e aussi long que les deux précédents ensembles en triangle curviligne.

Insecte presque glabre en dessus, pourvu seulement de très petites squamules dans les points, mais couvert sur le dessous (abdomen excepté) sur la face inférieur des fémurs et des tibias et sur les tarses d'une pubescence pruineuse grise et hydrofuge.

Genre voisin d'*Ochetina* Pasc. dont il diffère par les tibias droits leur onglet apical petit et distinct seulement aux pattes antérieures, le 4.e article des tarses long, l'impression du 1.er segment ventral.

Le génotype est:

C. singularis n. sp.

Ovale, noir, peu brillant, les antennes (massue noire excepté) ferrugineuses, les ongles roux.

Rostre aussi long que la tête et le prothorax, assez épais, presque droit, arrondi sur ses bords, á ponctuation très serrée mais peu profonde et fine. Tête avec les yeux conique, lisse, marquée seulement de quelques petits points épars. Prothorax transversal, sa plus grande largeur vers le tiers antérieur, de ce point les côtés subrectilignes et convergents, plus fortement en avant qu'en arrière, d'égale largeur à ses extrémités, non contracté en avant; fortement convexe, les points espacés, superficiels, remplis par des squamules rondes d'un gris a reflet cuivreux.

Elytres subrectangulaires, courts, fortement convexes, grossièrement ponctués-striés, les interstries convexes, parsemés de petites squamules légèrement métalliques.

♂. Plus petit. Impression du 1.er segment ventral plus profonde, le segment anal plus étroit.

Long. 2,5 - 2,8 mm.

Brésil: Matto Grosso, Curumbá (ex Staudinger), une longue série de spécimens; types dans ma collection.

Les pattes ont parfois une teinte lie de vin.

Neobagous vulgatus n. sp. (*N. brasiliensis* m. in litt.)

Oblong, brun, parfois ferrugineux, les antennes et les pattes d'un rouge ferrugineux, revêtu d'une couche de squamules jaunâtres, voilant complètement les téguments, moins serrées sur le milieu des élytres.

Rostre cylindrique, modérément courbé, aussi long que le prothorax, lisse mais densément squamulé sauf au sommet. Tête finement et éparsément pointillée. Antennes fines, insérées vers le tiers apical du rostre, le 2.e article du funicule aussi long que le 1.er, les suivants courts, serrés, graduellement élargis, la massue ovale, pubescente.

Prothorax un peu plus large que long, faiblement dilaté arrondi sur les côtés, sa plus grande largeur vers le tiers antérieur, assez fortement impressionné transversalement derrière le bord antérieur, peu convexe, à ponctuation serrés, assez profonde. Ecusson indistinct.

Elytres moitié plus larges et trois fois aussi long que le prothorax, parallèles jusqu'au tiers postérieur, le calus huméral assez élevé, la déclivité postérieure brusque, le sommet légèrement prolongué en bec; stries internes fortes, leurs points gros et serrés, les autres stries fines et voilées par le revêtement, interstries légèrement convexes,

Tarses assez allongés ,le 1.er article beaucoup plus long que le 2.e, ce dernier conique et plus long que large, le 3.e plus long et notablement plus large que le 2.e, et incomplètement bilobé. Prosternum plan devant les hanches.

Long.: 3,5 - 3,7 mm.

Brésil: Matto Grosso, Corumbá (ex Staudinger), 11 spécimens, ma collection.

Espèce voisine de *N. filicornis* m. dont elle se distingue par sa forme plus courte, le rostre plus court, l'absence de soies sur les élytres, la taille moindre.

Neobagous setosus n. sp.

Oblong, brun, les antennes et les pattes d'un rouge ferrugineux, assez luisant, revêtu de petites squamules cendrées formant avec le prothorax trois bandes peu tranchées et sur les élytres quelques petites taches éparses; muni en outre de soies, sur le prothorax courtes et dirigées en avant, sur les interstries impairs des élytres, plus longues, alignées, particulièrement sur la déclivité postérieure.

Rostre plus court que le prothorax, épais, peu arqué, anguleux sur les côtés, rugueusement ponctué et caréné au milieu. Tête à ponctuation serrés, ses squamules très fines.

Prothorax aussi long que large, d'égale largeur à ses extrémités, ses côtés peu arqués, légèrement étranglé latéralement en avant; peu convexes, couvert de granules squamulés serrés. Ecusson petit mais distinct, plan.

Elytres moitié plus larges et trois fois aussi longs que le prothorax, le calus huméral brièvement arrondi et élevé, les côtés parallèles jusqu'au milieu, puis convergents, au sommet un peu étirés et arrondis brièvement ensemble; convexes, pourvus de séries de points assez forts, arrondis et serrés, les interstries beaucoup plus larges que les points et plans.

Tibias légèrement bisinués en dedans, onguiculés au sommet, les antérieurs avec une ligne interne de cils courts. Tarses courts, le 2.e article fortement transversal, le 3.e peu plus large et un peu plus long que le 2.e, le 4.e long, avec les ongles aussi long que les trois articles précédents ensemble. Prosternum plan devant les hanches. Mésosternum caréné entre les hanches intermédiaires.

Long.: 2,5 mm.

Argentina: Prov. Buenos Aires, Quilmes, 2-11-1919 (J. Bosq), un spécimen, ma collection.

Bagoidellus n. gen.

Antennes grêles, glabres, le scape épaissi au sommet et atteignant juste l'oeil, le premier article de la massue conique, corné, glabre, obliquement tronqué au sommet, beaucoup plus long que le reste pubescent de la massue.

Tibias droits, onguiculés au sommet, légèrement bissinués en dedans. Tarses allongés, linéaires, tous beaucoup plus longs que larges, le 3.e article à peine aussi long et très peu plus large que le 2.e, incomplète-

ment bilobé, le 4.e assez court, moins long que les deux, précédents ensemble, grêle, ses ongles longs, divariqués. Hanches intermédiaires subcontigues, les antérieures contigues, le prosternum plan en avant. Lobes oculaires du prothorax médiocres.

Ce genre diffère des *Neobagous, Neohydronomus* par la conformation de la massue antennaire, des *Hydrotimetes* Kolbe, *Lissorhoptrus* Lec., par celle des tibias.

Le genotype est:

Bagoidellus vernicatus n. sp.

Ovale-oblong, brun noir, le rostre, les pattes et les antennes d'un rouge ferrugineux, le revêtement dorsal vernissé, brillant, jaunâtre.

Rostre cylindrique, aussi long que le prothorax, assez fortement arqué, lisse, brillant, à pointillé excessivement fin et épars. Tête squamulée, le front légèrement impressionné. Antennes insérées un peu en avant du milieu du rostre, fines, glabres (sommet de la massue excepté), le 2.e article du funicule aussi long que le 1.er, les suivants courts, serrés, graduellement élargis.

Prothorax ovale, plus large que long, notablement plus large en arrière qu'en avant, les côtés régulièrement et assez fortement arqués; peu convexe, la ponctuation peu profonde et assez serrée. Ecusson indistinct.

Elytres assez courts, ovalaires, moitié plus larges et deux fois et demie aussi longs que le prothorax, les épaules obliquement arrondies, les côtés légèrement arqués jusqu'au tiers postérieur, puis fortement rétrécis arrondis et assez largement arrondis ensemble au sommet; peu convexes, les stries à points forts, profonds et serrés, les interstries plus larges que les stries, subplans an avant, convexes en arrière.

Pattes assez longues, les 2.e et 3.e articles des tarses du double aussi longs que larges, le 4.e beaucoup plus grêle.

Long: 2,5 mm.

Brésil: Matto Grosso, Corumbá, un spécimen, ma collection (ex Staudinger).

Neochetina affinis m.

Brésil: Matto Grosso, Corumbá, un spécimen (ex Staudinger). Spécimen un peu plus petit que ceux de l'Argentine.

Neochetina Bruchi m.

Brésil: Matto Grosso, Corumbá, un spécimen, Amazonas, deux spécimens (ex Staudinger).

Alloscolytroproctus n. gen. *Campyloscelina* (sensu J. Faust)

Forme linéaire cylindrique. Rostre cylindrique, court, arqué, pourvu en dessous de deux sillons séparés par une carène, rapprochés en arrière, s'écartant en avant. Scrobes placés à la base du rostre, courts, en forme d'accent circonflexe renversé. Antennes robustes, insérées à peu de distance des yeux; scape épais, graduellement épaissi, glabre, atteignant presque le bord antérieur du prothorax; funicule presque

glabre, de 6 articles, le 2.e subconique, plus court que le 1.er, à peine aussi long que large, les suivants fortement transversaux, très serrés, grossissant peu a peu, la massue ovale, grosse, compacte, densément pubescente de cendré, aussi longue que les 5 articles précédents ensemble. Tête conique, les yeux assez petits, presque plans, leurs facettes fines, largement séparés en dessus et en dessous. Prothorax oblong, plus longue que large, tronqué a ses extrémités. Ecusson petit, carré. Elytres parallèles, aussi larges et peu plus longs que le prothorax, subtronqués ensemble au sommet, ne recouvrant pas le pygidium, ce dernier grand et vertical.

Fémurs inermes, graduellement et fortement élargis, fortement comprimés à la base, particulièrement les postérieurs, pourvus en dessous d'une ligne de cils courts, plus longs et plus serrés sur les intermédiaires. Tibias antérieurs et intermédiaires creusés et bidentés au sommet, les antérieurs sinueux et ciliés extérieurement, les intermédiaires finement crénelés denticulés sur leur bord externe, les postérieurs plus épais, arqués, avec plusieurs rangs de cils, carénés, sillonnés, au sommet creusés et avec une dent externe. Tarses étroits, allongés, en dessous avec une touffe de pubescence au sommet des articles, en dessus avec quelques cils; 1.er article plus long que les deux suivants réunis, le 2.e à peine aussi large que le 1.er et à peu près aussi long que large, le 3.e un peu plus long et un peu plus large que le 2.e faiblement échancré, le 4.e grand, aussi long que le 1.er, ses ongles grands et libres.

Prosternum convexe en avant, légèrement impressionné latéralement contre les hanches, derrière ces dernières étroit et formant deux faibles gibbosités obliques, les hanches étroitement séparées; bord antérieur pourvu d'une frange de très courts cils serrés et jaunes, et en arrière d'un sillon transversal continué en dessus, sur le prothorax, par un fort sillon transversal. Mésosternum grand, légèrement convexe, creusé devant les hanches, ses épimères grands, les hanches aussi étroitement séparées que les antérieures. Métasternum long, pourvu en arrière d'une profonde impression médiane triangulaire prolongée jusqu'au milieu par un étroit sillon, épisternes grands. Premier segment ventral très court derrière les hanches, sa saillie intercoxale large et arrondie en avant; 2.e segment moins long que les 3.e et 4.e ensemble, ponctué en avant, lisse en arrière; 3.e et 4.e segments lisses ou avec quelques points en avant; 5.e segment plus long que les 3.e et 4.e ensemble; tous les segments sur les côtés et le 5.e en entier couverts d'une pubescence veloutée et foncée.

♂. Impression du métasternum plus profonde; 5.e segment ventral sinué au sommet.

Genre singulier, unique représentant des *Campyloscélides* dans l'Amérique méridionale.

Il se distingue des genres connus par de nombreux caractères: funicule antennaire de six articles, fémurs non dentés, etc.

Le génotype est:

A. peruanus n. sp.

Linéaire, noir, brillant, les points du prothorax, de la tête, du rostre, tapissés au fond de squamules cendrées, les élytres revêtus d'une dense pubescence veloutée en majeure partie d'un brun noir, mais plus

longue, jaune, formant une crête sur le milieu du deuxième interstrie, pourvus en outre ainsi que le pygidium de soies courtes, noires et alignées au sommet des interstries, jaunes sur le pygidium.

Rostre moins long que le prothorax, à ponctuation fine et assez serrée; tête ponctuée comme la base du rostre, le front avec un point plus gros. Base du scape antennaire d'un brun rouge.

Prothorax moitié plus long que large, le bord antérieur moins large que la base, cilié sur les côtés, suivi d'un sillon profond, étranglant fortement les bords latéraux; peu convexe, à points assez forts, séparés par des intervalles aussi grands que les points, la ligne médiane lisse. Ecusson plan, lisse, glabre.

Elytres fortement striés, la suture plane en avant, enfoncée dans le milieu, convexe en arrière, les interstries, particulièrement le 2.e fortement carénés.

Long: 7-8 mm.

Perou: Marcapata, type, ma collection (ex Staudinger) diverses collections de la même provenance.

La pubescence jaune forme souvent des lignes non seulement sur le 2.e interstrie mais aussi sur quelques autres interstries; ces lignes sont de longueur variable.